

登録日 2009/5/19

登録番号 CNST001

腫瘍名 脳腫瘍

申請科 脳神経外科

投与スケジュール

ICE-G				28日毎 × 5コース					
				1コース					2コース
				1	2	3	4	5	29 (day)
①	プロイメンド 生理食塩水	150 mg 500 mL	点滴 60分 (10:00)		↓				
②	デキサート アロキシ 生理食塩水	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴 15分	↓					↓
③	デキサート 生理食塩水	6.6 mg/m ² 50 mL	点滴 15分 (11:00)	↓	↓	↓			
④	カルボプラチン 5%ブドウ糖	450 mg/m ² 500 mL	点滴 60分	↓					↓
⑤	生理食塩水 (カルボプラチン後のフラッシュ)	50 mL	点滴 5分	↓					↓
⑥	エトポシド 5%ブドウ糖	100 mg/m ² 500 mL	点滴 60分 (11:15)	↓	↓	↓			
⑦	イホマイド 生理食塩水	2 g/m ² 500 mL	点滴 60分 (12:15)	↓	↓	↓			
⑦'	ウロミテキサン 生理食塩水 (⑦のイホマイドと同時に投与)	800 mg 50 mL	側管 15分 (12:15)	↓	↓	↓			
⑧	マンニトール	300 mL	点滴 60分 (13:15)	↓	↓	↓			
⑨	ソルデム3A 7%メイロン	500 mL 20 mL	点滴 120分 (14:15)	↓	↓	↓			
⑩	ソルデム3A	500 mL	点滴 180分 (16:15)	↓	↓	↓			
⑩'	ウロミテキサン 生理食塩水 (⑩のソルデム3Aと同時に投与)	800 mg 50 mL	側管 15分 (16:15)	↓	↓	↓			
⑪	ソルデム3A 7%メイロン	500 mL 20 mL	点滴 240分 (19:15)	↓	↓	↓			
⑫	ウロミテキサン 生理食塩水 (⑪のソルデム3A投与開始1時間後に投与)	800 mg 50 mL	側管 15分 (20:15)	↓	↓	↓			
⑬	ソルデム3A (翌日のデキサート投与開始までキープ)	500 mL	点滴 12時間 (23:15)	↓	↓	↓			
⑭	ジーラスタ	3.6 mg	皮下注 (15:00)						↓

注意事項

- ・PVCフリーの輸液セットを使用すること(型番JP-PBX8000FL)
- ・骨髄抑制予防対策として、G-CSF製剤(ジーラスタ)を予防投与(Day4イホマイド投与終了から24時間経過後に投与)
- ・点滴時間の下、()内の時間は投与の開始時間を記載した。
- ⑬のソルデム3Aは翌日のデキサートまで速度調整してキープ。
- ・2015/12/11 支持療法や輸液投与時間について一部改訂

参考文献

1) 慶應義塾大学・関連病院「脳腫瘍」共同研究班, 悪性脳腫瘍治療指針2015.