

# メソトレキセート大量療法

## 点滴・注射・投薬・検査チェックリスト

	時間	点滴	○	時間	薬剤	○	内服	○	原pH測定	時間	pH	尿量測定 (8hごと)	8hあたり尿量	10:00〜一日尿量	検査	○	
DAY 0	14:00						朝食後または入院時:ダイアモックス250mg								入院後:採血(腎機能)・検尿		
	18:00	①フジオ 140 500ml /4h					夕食後:ダイアモックス250mg										
	22:00	②フジオ 140 500ml /4h					持参薬確認 続行										
DAY 1 投与開始日	2:00	①フジオ 140 500ml /4h							(朝食後)	( )							
	6:00	②フジオ 140 500ml+ 7%メイロン2A/4h		9:45	アロキシ 0.75mg デキサート 13.2mg 生理食塩水50ml/15min		朝食後:ダイアモックス250mg		MTX投与2時間前	8:00							
	10:00	③フジオ 140 500ml+ 7%メイロン2A + ガスター 1A/4h		10:00	創傷から:メソトレキセート100mg/kg + 生理食塩水 500ml/3h				MTX投与直前	8:45		10:00		前日から( )			
	14:00	④フジオ 140 500ml+ 7%メイロン2A/4h							MTX投与終了時	13:00		16:00					
	18:00	⑤フジオ 140 500ml+ 7%メイロン2A + ガスター 1A/4h					夕食後:ダイアモックス250mg		MTX投与7時間後	17:00							
	22:00	⑥フジオ 140 500ml+ 7%メイロン2A/4h							夕食後	18:00		22:00					
DAY 2	2:00	①フジオ 140 500ml+ 7%メイロン2A/4h		2:00													
	6:00	②フジオ 140 500ml+ 7%メイロン2A/4h		6:00			朝食後:ダイアモックス250mg		朝食後	8:00		4:00					
	10:00	③フジオ 140 500ml+ 7%メイロン2A + ガスター 1A/4h		10:00	ロイコボリン 15mg 生理食塩水100ml/30min		10:00:ロイコボリン2A + 8%ブドウ糖100ml					10:00			10:00:投与24時間後MTX血中濃度採血・検尿		
	14:00	④フジオ 140 500ml+ 7%メイロン2A/4h		14:00	ロイコボリン 15mg 生理食塩水100ml/30min							16:00					
	18:00	⑤フジオ 140 500ml+ 7%メイロン2A + ガスター 1A/4h		18:00	ロイコボリン 15mg 生理食塩水100ml/30min		夕食後:ダイアモックス250mg		夕食後	18:00							
	22:00	⑥フジオ 140 500ml+ 7%メイロン2A/4h		22:00	ロイコボリン 15mg 生理食塩水100ml/30min							22:00					
DAY 3	2:00	①フジオ 140 500ml+ 7%メイロン2A/4h		2:00	ロイコボリン 15mg 生理食塩水100ml/30min												
	6:00	②フジオ 140 500ml+ 7%メイロン2A/4h		6:00	ロイコボリン 15mg 生理食塩水100ml/30min		朝食後:ダイアモックス250mg		朝食後	8:00		4:00					
	10:00	③フジオ 140 500ml+ 7%メイロン2A + ガスター 1A/8h		10:00	ロイコボリン 15mg 生理食塩水100ml/30min							10:00			10:00:投与24時間後MTX血中濃度採血・検尿		
	16:00	④フジオ 140 500ml+ 7%メイロン2A/8h		16:00	ロイコボリン 15mg 生理食塩水100ml/30min		夕食後:ダイアモックス250mg		夕食後	18:00		16:00					
	22:00	⑤フジオ 140 500ml+ 7%メイロン2A + ガスター 1A/8h		22:00	ロイコボリン 15mg 生理食塩水100ml/30min							22:00					
DAY 4	4:00	①フジオ 140 500ml+ 7%メイロン2A/8h		4:00	ロイコボリン 15mg 生理食塩水100ml/30min		朝食後:ダイアモックス250mg		朝食後	8:00		4:00					
	10:00	②フジオ 140 500ml+ 7%メイロン2A + ガスター 1A/8h		10:00	ロイコボリン 15mg 生理食塩水100ml/30min							10:00			10:00:投与24時間後MTX血中濃度採血・検尿		
	16:00	③フジオ 140 500ml+ 7%メイロン2A/8h		16:00	ロイコボリン 15mg 生理食塩水100ml/30min		夕食後:ダイアモックス250mg		夕食後	18:00		16:00					
	22:00	④フジオ 140 500ml+ 7%メイロン2A + ガスター 1A/8h		22:00	ロイコボリン 15mg 生理食塩水100ml/30min							22:00					
DAY 5	4:00	①フジオ 140 500ml /8h		4:00	ロイコボリン 15mg 生理食塩水100ml/30min		朝食後:ダイアモックス250mg		朝食後	8:00		4:00					
	10:00	②フジオ 140 500ml /8h		10:00	ロイコボリン 15mg 生理食塩水100ml/30min							10:00			10:00:投与24時間後MTX血中濃度採血・検尿		
	16:00	③フジオ 140 500ml /8h		16:00	ロイコボリン 15mg 生理食塩水100ml/30min		夕食後:ダイアモックス250mg		夕食後	18:00		16:00					
	22:00	右配施行後 抜針		22:00	ロイコボリン 15mg 生理食塩水100ml/30min 抜針							22:00					