

登録日 2007/3/30

レジメン名 BRE002

腫瘍名 乳がん

申請医師 乳腺外科

### 投与スケジュール

			21日毎 × 4～6コース	
			1コース	2コース
			1 3 8 15	22 ... (Day)
①	デキサート パロノセトロン 生理食塩水	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴 15分	
②	エピルピシン 生理食塩水	100 mg/m <sup>2</sup> 50 mL	点滴 5分 (全開投与)	
③	生理食塩水 (エピルピシン用フラッシュ)	100 mL	点滴 5分 (全開投与)	
④	エンドキサン 生理食塩水	600 mg/m <sup>2</sup> 100 mL	点滴 30分	
⑤	生理食塩水 (エンドキサン用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分	
⑥	ジーラスタ	3.6 mg	皮下注	

### 注意事項

【使用上の注意】

- ・エピルピシン  
総投与量900mg/m<sup>2</sup>以上で心毒性増大。静脈炎予防のために全開投与必要。壊死性抗がん剤
- ・催吐高リスク  
イメンド内服を投与 (Day1:125mg, Day2～3:80mg)、Day2～4までデカドロン8mgを投与
- ・ジーラスタ併用

### 参考文献

乳癌診療ガイドライン