

登録日 2007/3/30

レジメン名 BRE003

腫瘍名 乳がん

申請医師 乳腺外科

投与スケジュール

FEC			21日毎 × 4~6コース	
			1コース	2コース
			1 3	22 ... (Day)
①	デキサート パロノセトロン 生理食塩水	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴 15分	↓
②	エピルピシン 生理食塩水	100 mg/m ² 50 mL	点滴 5分 (全開投与)	↓
③	生理食塩水 (エピルピシン用フラッシュ)	100 mL	点滴 5分 (全開投与)	↓
④	エンドキサン 生理食塩水	500 mg/m ² 250 mL	点滴 60分	↓
⑤	フルオロウラシル 生理食塩水	500 mg/m ² 50 mL	点滴 5分	↓
⑥	生理食塩水 (フルオロウラシル用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開投与)	↓
⑦	ジーラスタ	3.6 mg	皮下注	↓

注意事項

エピルピシン: 総投与量900mg/m²以上で心毒性増大
壊死性抗がん剤
催吐高リスク: イメンド内服を投与、Day2~4までデカドロン8mgを投与
ジーラスタ併用
【参考】
FEC単独は6コース
FEC→PTX逐次治療はFEC4コース

参考文献

乳癌診療ガイドライン