

登録日 2017/8/28

レジメン名 BRE012

腫瘍名 乳がん

申請医師 乳腺外科

投与スケジュール

DTX+Tmab			21日毎 術後:4コースまで	
			1コース	2コース
			1 8 15	22 ... (day)
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL 点滴 5分	↓	↓
②	トラスツズマブBS 蒸留水 20~40 mL 生理食塩水 250 mL	6 mg/kg 点滴 30分	↓	↓
			初回投与量:8mg/kg、2回目以降投与量:6mg/kg 初回90分投与、2回目以降30分に短縮可能	
③	生理食塩水 (トラスツズマブ用フラッシュ)	50 mL 点滴 5分	↓	↓
④	デキサート 生理食塩水	6.6 mg 点滴 15分 50 mL	↓	↓
⑤	ドセタキセル 5%ブドウ糖液	75 mg/m ² 点滴 60分 250 mL	↓	↓
⑥	生理食塩水 (ドセタキセル用フラッシュ)	50 mL 点滴 5分	↓	↓

注意事項

- ・トラスツズマブ投与は、病理結果にてHER2蛋白陽性者に限る。
- ・初回投与の認容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。
- ・トラスツズマブ初回投与時には、カロナールまたはNSAIDsなどの前投薬を検討する。
- ・トラスツズマブは、投与予定日より1週間を超えた後に投与する際に改めて初回量で投与する。
- ・トラスツズマブ投与の際には、心エコーによる心機能を確認する。
モニタリングの頻度は、通常の患者では12週毎、無症候性心機能障害者では6~8週毎に行う。

参考文献

1) 乳がん診療ガイドライン2015