

登録日 2018/2/26

レジメン名 BRE016

腫瘍名 乳がん

申請医師 乳腺外科

投与スケジュール

PTX+Bmab				28日毎				
				1コース			2コース	(day)
				1	8	15	29	...
①	デキサート ポラミン ファモチジン 生理食塩水	6.6 mg 5 mg 20 mg 50 mL	点滴 15分	↓	↓	↓	↓	
②	パクリタキセル 5%ブドウ糖	90 mg/m ² 250 mL	点滴 60分	↓	↓	↓	↓	
③	生理食塩水 (フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓	↓	↓	↓	
④	ペバシズマブBS 生理食塩水	10 mg/kg 100 mL	点滴 30分	↓		↓	↓	
				初回90分、副作用なければ2回目60分、3回目以降30分に短縮可				
⑤	生理食塩水 (フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓		↓	↓	

注意事項

【適応】局所再発・転移性乳癌(原則、3次治療以降で用いる場合は主治医に確認をする)
【注意事項】
・パクリタキセル投与時には、0.22ミクロン以下のインラインフィルターを用いる。
・減量基準 参考文献3)の参考値
好中球数1000~1500/mm ³ 、血小板数<7.5万~10万/mm ³ 、ビリルビン>1.6~2.5mg/dL、
好中球減少の期間が延長する、減少に関連する発熱、PLT<4万/mm ³ に関連する出血、PLT<2万/mm ³
→パクリタキセル: 65mg/m ²
・投与延期
Grade3の神経障害(Grade0 or 1 に回復して減量した用量で再開する)
・投与中止
減量後のGrade3 or 4の神経障害、重症過敏症、3週以上継続するGrade3, 4の神経障害

参考文献

1) 乳癌診療ガイドライン 2015年版
2) European Journal of cancer, 70, 146-155 (2017).
3) N Engl J Med, 357, 2666-2676 (2007).