

登録日 2019/3/26

レジメン名 BRE021

腫瘍名 乳がん

申請医師 乳腺外科

投与スケジュール

HAL+Pertuzumab+Tmab				21日毎 × PDまで			
				1コース		2コース	
				1	8	15	22 ... (Day)
①	デキサート	6.6 mg	点滴 15分	↓	↓		↓
	生理食塩水	50 mL					
②	生理食塩水 (前投薬用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分	↓			↓
③	パージェタ	420 mg	点滴 30分	↓			↓
	生理食塩水	250 mL					
	初回投与量: 840mg、2回目以降投与量: 420mg 初回60分投与、2回目以降30分に短縮可能						
④	生理食塩水 (パージェタ用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分	↓			↓
⑤	トラスツズマブBS	6 mg/kg	点滴 30分	↓			↓
	蒸留水	20~40 mL					
	生理食塩水	250 mL					
	初回投与量: 8mg/kg、2回目以降投与量: 6mg/kg 初回90分投与、2回目以降30分に短縮可能						
⑥	生理食塩水 (トラスツズマブ用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分	↓			↓
⑦	ハラヴェン	1.4 mg/m ²	点滴 5分	↓	↓		↓
	生理食塩水	50 mL					
⑧	生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL	点滴 5分	↓	↓		↓

注意事項

【適応】 <ul style="list-style-type: none">手術不能または再発乳癌の一次治療パージェタ+トラスツズマブ+化学療法の治療歴がある進行、再発乳癌における三次治療以降(2022年12月27日)
【使用上の注意】 <ul style="list-style-type: none">パージェタおよびトラスツズマブは、病理結果にてHER2蛋白陽性者に限る。パージェタおよびトラスツズマブは、初回投与の認容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。トラスツズマブ初回投与時には、カロナールまたはNSAIDsなどの前投薬を検討する。パージェタおよびトラスツズマブ投与の際には、心エコーによる心機能を確認する。 モニタリングの頻度は、通常の患者では12週毎、無症候性心機能障害者では6~8週毎に行う。ハラヴェンは、QT間隔延長が報告されており、投与前に心電図を行うこと。ハラヴェンは、無水エタノールを含有するため、アルコール過敏に注意(禁忌ではない)。
【投与延期してから再開する際の用量】 <ul style="list-style-type: none">パージェタ : 前回投与から6週未満 ⇒ 420mg、 前回投与から6週以上の場合 ⇒ 840mg(次回以降420mg)トラスツズマブ : 前回投与から6週未満 ⇒ 6mg/kg、 前回投与から6週以上の場合 ⇒ 8mg/kg(次回以降6mg/kg)
【減量・中止基準】 <ul style="list-style-type: none">適正使用ガイド参照

参考文献

1) Araki K, <i>et al.</i> , The Breast, 35, 78-84 (2017).
2) パージェタ添付文書
3) ハーセプチン添付文書
3) ハラヴェン添付文書
4) パージェタ、ハーセプチン、ハラヴェン適正使用ガイド
5) Cancer Science, 113, 3169-3179 (2022).

1コース



- | | | | | | |
|---|---------------------------|---|--------|---|---|
| ① | デキサート
生理食塩水 | 6.6 mg
50 mL | 点滴 15分 | ↓ | ↓ |
| ② | 生理食塩水
(前投薬用フラッシュ) | 50 mL | 点滴 5分 | ↓ | |
| ③ | パージェタ
生理食塩水 | 420 mg
250 mL | 点滴 30分 | ↓ | |
| | | 初回投与量: 840mg、2回目以降投与量: 420mg
初回60分投与、2回目以降30分に短縮可能 | | | |
| ④ | 生理食塩水
(パージェタ用フラッシュ) | 50 mL | 点滴 5分 | ↓ | |
| ⑤ | トラスツズマブBS
蒸留水
生理食塩水 | 6 mg/kg
20~40 mL
250 mL | 点滴 30分 | ↓ | |
| | | 初回投与量: 8mg/kg、2回目以降投与量: 6mg/kg
初回90分投与、2回目以降30分に短縮可能 | | | |
| ⑥ | 生理食塩水
(トラスツズマブ用フラッシュ) | 50 mL | 点滴 5分 | ↓ | |
| ⑦ | ハラヴェン
生理食塩水 | 1.4 mg/m ²
50 mL | 点滴 5分 | ↓ | ↓ |
| ⑧ | 生理食塩水
(フラッシュ用) | 50 mL | 点滴 5分 | ↓ | ↓ |

