

登録日 2020/1/28

レジメン名 BRE024

腫瘍名 乳がん

申請医師 乳腺外科

### 投与スケジュール

nab-PTX+Atezolizumab				28日毎 × PDまで				
				1コース		2コース		
				1	8	15	29	... (Day)
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴 5分	↓		↓	↓	
②	テセントリク 生理食塩水	840 mg 100 mL	点滴 30分	↓		↓	↓	
初回60分投与、2回目以降30分に短縮可能								
③	生理食塩水 (テセントリク用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分	↓		↓	↓	
④	グラニセトロン 生理食塩水	1 mg 50 mL	点滴 15分	↓		↓	↓	
側管 (Day1、15のみ)								
⑤	グラニセトロン 生理食塩水	1 mg 50 mL	点滴 30分		↓		↓	
⑥	アブラキサン 生理食塩水	100 mg/m <sup>2</sup> 100 mL	点滴 30分	↓	↓	↓	↓	
側管 (Day1、15のみ)								
⑦	生理食塩水 (アブラキサン用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分	↓	↓	↓	↓	
側管 (Day1、15のみ)								

### 注意事項

#### 【適応】

- ・手術不能または再発乳癌
- ・ホルモン陰性、HER2陰性、PD-L1陽性 (PD-L1 ≥ 1%)

#### 【調製上及び使用上の注意】

- ・手術不能または再発乳癌の一次治療
- ・テセントリクは、PD-L1陽性者に限る。
- ・テセントリクは、インラインフィルターを使用 (0.2または0.22 μm)  
同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
- ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。
- ・アブラキサンは、インラインフィルターを使用しない (アルブミン結合製剤のため、目詰まりを起こすため)  
特定生物由来製品に該当することから、施用記録の保存は他の特定生物由来製品に準ずる。

#### 【投与基準、減量基準】

- ・アブラキサン、テセントリクの適正使用ガイド参照

1) P. Schmid, *et al*, N Engl J Med, 379, 2108-2121 (2018).

2) テセントリク、アブラキサン添付文書

3) テセントリク、アブラキサン適正使用ガイド