

登録日 2021/10/26

レジメン名 BRE029

腫瘍名 乳がん

申請医師 乳腺外科

投与スケジュール

PTX+Pembrolizumab			PDまで														
			以下の投与日は1週毎に表記														
			1	8	15	22	29	36	43	50	57	64	71	78	85	...	(Day)
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL 点滴 5分	↓			↓			↓			↓			↓		
②	キイトルーダ 生理食塩水	200 mg 点滴 30分 100 mL	↓			↓			↓			↓			↓		
③	生理食塩水 (キイトルーダ用フラッシュ)	50 mL 点滴 5分	↓			↓			↓			↓			↓		
④	デキサート ポラミン ファモチジン 生理食塩水	6.6 mg 点滴 15分 5 mg 20 mg 50 mL	↓	↓	↓		↓	↓	↓		↓	↓	↓		↓		
⑤	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	90 mg/m ² 点滴 60分 250 mL	↓	↓	↓		↓	↓	↓		↓	↓	↓		↓		
⑥	生理食塩水 (パクリタキセル用フラッシュ)	50 mL 点滴 5分	↓	↓	↓		↓	↓	↓		↓	↓	↓		↓		

注意事項

【適応】

- ・手術不能または再発乳癌の一次治療
- ・ホルモン陰性、HER2陰性、PD-L1陽性(CPS≥10)

【調製上及び使用上の注意】

- ・パクリタキセルはPVCフリー点滴ライン、インラインフィルター(0.22 μm)を使用
- ・キイトルーダはインラインフィルター(0.2~5μm)を使用する。
- ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。
- ・キイトルーダは3週毎に投与し、パクリタキセルは3投1休で投与する。

1) Lancet, 396, 1817-1828 (2020).
 2)キイトルーダ添付文書 2021年8月改訂版
 3)パクリタキセル添付文書 2020年4月改訂版