

登録日 2022/10/11

登録番号 Cer019

腫瘍名 子宮頸がん

申請診療科 産婦人科

投与スケジュール

PTX+CDDP+Bmab+Pembrolizumab			21日毎 × 6コース 7コース目から維持療法	
			1コース	2コース
			1 2 3 4	22 ... (day)
アプレピタント (Day1:125mg, Day2:80mg, Day3:80mg) 投与確定後に服用	内服		↓	↓
デカドロン 8 mg	内服		↓	↓
① 生理食塩水 (プライミング用) 50 mL	点滴 5分		↓	↓
② キイトルーダ 200 mg/body 生理食塩水 100 mL	点滴 30分		↓	↓
③ 生理食塩水 50 mL (キイトルーダ用フラッシュ)	点滴 5分 (全開)		↓	↓
④ デキサート 19.8 mg パロノセトロン 0.75 mg ボラミン 5 mg ファモチジン 20 mg 生理食塩水 50 mL	点滴 15分		↓	↓
⑤ バクリタキセル 175 mg/rt 5%ブドウ糖 500 mL	点滴 180分		↓	↓
⑥ シスプラチン 50 mg/rt 生理食塩水 500 mL	点滴 120分		↓	↓
⑦ 生理食塩水 50 mL (シスプラチン用フラッシュ)	点滴 5分 (全開)		↓	↓
⑧ アバスチン 15 mg/kg 生理食塩水 250 mL 初回90分、2回目60分、3回目以降30分に短縮可	点滴 30分		↓	↓
⑨ 生理食塩水 250 mL	点滴 60分		↓	↓
⑩ 生理食塩水 500 mL	点滴 120分		↓	↓
⑪ ソルデム3A 500 mL	点滴 120分		↓	↓
⑫ 生理食塩水 500 mL	点滴 120分		↓	↓
⑬ ソルデム3A 500 mL	点滴 120分		↓	↓
⑭ ヘパフラッシュ 500 単位 ヘパロック用			↓	↓

Bmab+Pembrolizumab 維持療法			7コース	8コース
			1 2 3 4	22 ... (day)
① 生理食塩水 (プライミング用) 50 mL	点滴 5分		↓	↓
② キイトルーダ 200 mg/body 生理食塩水 100 mL	点滴 30分		↓	↓
③ 生理食塩水 50 mL (キイトルーダ用フラッシュ)	点滴 5分 (全開)		↓	↓
④ アバスチン 15 mg/kg 生理食塩水 250 mL 初回90分、2回目60分、3回目以降30分に短縮可	点滴 30分		↓	↓
⑤ 生理食塩水 250 mL (アバスチン用フラッシュ)	点滴 60分 (全開)		↓	↓

注意事項

- 【適応】進行・再発子宮頸癌(PD-L1発現率(CPS)を測定し、CPSが1未満の場合は他の治療選択肢も考慮すること)
- Day1のアプレピタントは投与確定後に服用
- キイトルーダ及びバクリタキセルはインラインフィルターを使用。
- 同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
- 免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照
- シスプラチン投与終了4時間後、尿量1L以下は、ソルアセトF500mLおよびラシックス1Aを使用する。

参考文献

1) New Engl J Med, 385, 1856-1867 (2021).
 2) 各添付文書(キイトルーダ2022年9月改訂版、バクリタキセル2020年4月改訂版、カルボプラチン2022年改訂版、アバスチン2022年6月改訂版)
 3) 最適使用推進ガイドライン ペムブロリズマブ 子宮頸癌 令和4年9月版