

登録日 2022/10/11

登録番号 Cer020

腫瘍名 子宮頸がん

申請診療科 産婦人科

投与スケジュール

PTX+CBDCA+Pembrolizumab				21日毎 × 6コース 7コース目から維持療法	
				1コース	2コース
				1	22 ... (day)
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴 5分	↓	↓
②	キイトルーダ 生理食塩水	200 mg/body 100 mL	点滴 30分	↓	↓
③	生理食塩水 (キイトルーダ用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓	↓
④	デキサート ポラミン ファモチジン パロノセトロン 生理食塩水	19.8 mg 5 mg 20 mg 0.75 mg 50 mL	点滴 15分	↓	↓
⑤	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	175 mg/m ² 250 mL	点滴 120分	↓	↓
⑥	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC 5 250 mL	点滴 60分	↓	↓
⑦	5%ブドウ糖液 (カルボプラチン用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓	↓
Pembrolizumab 維持療法				7コース	8コース
				1	22 ... (day)
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴 5分	↓	↓
②	キイトルーダ 生理食塩水	200 mg/body 100 mL	点滴 30分	↓	↓
③	生理食塩水 (キイトルーダ用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓	↓

注意事項

【適応】進行・再発子宮頸癌(PD-L1発現率(CPS)を測定し、CPSが1未満の場合は他の治療選択肢も考慮すること)
 ・CBDCA量(mg) = AUC X (GFR + 25) GFRはCLcrで近似する。
 ・キイトルーダ及びパクリタキセルはインラインフィルターを使用。
 同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
 ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照

参考文献

1) New Engl J Med. 385, 1856-1867 (2021).
 2) 各添付文書(キイトルーダ2022年9月改訂版、パクリタキセル2020年4月改訂版、カルボプラチン2022年改訂版、アバスチン2022年6月改訂版)
 3) 最適使用推進ガイドライン ペムブロリズマブ 子宮頸癌 令和4年9月版