

登録日 2009/9/29

登録番号 Co1021

腫瘍名 大腸がん

申請医師 消化器内科

投与スケジュール

FOLFIRI+Cmab				14日毎×PD				
				1コース		2コース		
				1	2 3	8	15	… (day)
①	生理食塩水 (ポート穿刺用)	20 mL	点滴 5分	↓		↓	↓	
②	デキサート ポラミン 生理食塩水	9.9 mg 5 mg 50 mL	点滴 30分	↓			↓	
③	デキサート ポラミン 生理食塩水	3.3 mg 5 mg 50 mL	点滴 30分			↓		
④	生理食塩水	50 mL	点滴 5分	↓		↓	↓	
⑤	アービタックス 生理食塩水	250 mg/m ² 250 mL	点滴 60分	↓		↓	↓	
				初回アービタックス400mg/m ² 120分投与				
⑥	生理食塩水	250 mL	点滴 60分	↓		↓	↓	
⑦	パロノセトロン 生理食塩水	0.75 mg 50 mL	点滴 15分	↓			↓	
⑧	レボホリナート 5%ブドウ糖液	200 mg/m ² 250 mL	点滴 120分	↓			↓	
⑨	イリノテカン 5%ブドウ糖液	150 mg/m ² 250 mL	⑧と同時に 120分 点滴	↓			↓	
⑩	フルオロウラシル 生理食塩水	400 mg/m ² 50 mL	⑧、⑨終了後に 全開	↓			↓	
⑪	フルオロウラシル 生理食塩水	2400 mg/m ²	⑩終了後に 46時間かけて インフューザーポンプを使用して					
				*フルオロウラシルの量にあわせて総量が変わります。				
⑫	生食注シリンジ ポート内洗浄 患者持ち帰り用	10 mL	静注	↓			↓	

注意事項

KRASがWild Type geneの時のみ使用可
PDもしくは有害事象が発現するまで使用可
アービタックス初回は400mg/m²を120分で投与する

参考文献

Cetuximab and Chemotherapy as Initial Treatment for Metastatic Colorectal Cancer
N Engl J Med 2009;360:1408-17