

登録日 2010/5/22

登録番号 CoI023

腫瘍名 大腸がん

申請診療科 消化器内科

投与スケジュール

				14日毎 × PD	
				1コース	2コース
				1	15 ... (day)
① 生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴	5分	↓	↓
② ベクティピックス 生理食塩水	6 mg/kg 100 mL	点滴	60分	↓	↓
③ 生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL	点滴	5分	↓	↓
④ デキサート パロノセトロン 生理食塩水	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴	15分	↓	↓
⑤ レボホリナート 5%ブドウ糖液	200 mg/m ² 250 mL	点滴	120分	↓	↓
⑥ イリノテカン 5%ブドウ糖液	150 mg/m ² 250 mL	⑤と同時に 点滴	120分	↓	↓
⑦ フルオロウラシル 生理食塩水	400 mg/m ² 50 mL	⑤、⑥終了後に 全開	↓	↓	↓
⑧ フルオロウラシル 生理食塩水	2400 mg/m ²	⑦終了後に 46時間かけて インフューザーポンプを使用して	■	■	
*フルオロウラシルの量にあわせて総量が変わります。					
⑨ 生食注シリンジ ポート内洗浄 患者持ち帰り用	10 mL	静注	↓	↓	

注意事項

KRASがWild Type geneの時のみ使用可
PDもしくは有害事象が発現するまで使用可
皮膚障害対策フローに準じて、対策を行う。

参考文献

Peeters M, et al. ASCO GI 2010 Abstract 282