

登録日 2015/2/13

登録番号 CoI030

腫瘍名 大腸がん

申請診療科 消化器外科

投与スケジュール

mFOLFOX6+Pmab				14日毎 × PD	
				1コース	2コース
				1	15 ... (day)
① 生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴	5分	↓	↓
② ベクティピックス 生理食塩水	6 mg/kg 100 mL	点滴	60分	↓	↓
③ 生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL	点滴	5分	↓	↓
④ デキサート パロノセトロン 生理食塩水	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴	15分	↓	↓
⑤ レボホリナート 5%ブドウ糖液	200 mg/m ² 250 mL	点滴	120分	↓	↓
⑥ オキサリプラチン 5%ブドウ糖液	85 mg/m ² 250 mL	⑤と同時に 点滴	120分	↓	↓
⑦ フルオロウラシル 生理食塩水	400 mg/m ² 50 mL	⑤、⑥終了後に 全開		↓	↓
⑧ フルオロウラシル 生理食塩水	2400 mg/m ²	⑦終了後に 46時間かけて インフューザーを用いて		■	■
*フルオロウラシルの量にあわせて総量が変わります。					
⑨ 生食注シリンジ ポート内洗浄 患者持ち帰り用	10 mL	静注		↓	↓

注意事項

- ・KRASがWild Type geneの時のみ使用可
- ・PDもしくは有害事象が発現するまで使用可
- ・術後には用いない。進行・再発ではイリノテカン or オキサリプラチンベースのレジメンで1～2次治療にて使用する。
- ・皮膚障害対策フローに準じて、対策を行う。

参考文献

1) Douillard JY, *et al.*, Randomized, phase III trial of panitumumab with infusional fluorouracil, leucovorin, and oxaliplatin (FOLFOX4) versus FOLFOX4 alone as first-line treatment in patients with previously untreated metastatic colorectal cancer: the PRIME study, *J. Clin. Oncol.*, **28**, 4697-4705 (2010).

2) 大腸癌治療ガイドライン 医師用 2014年版