

登録日 2022/9/27

登録番号 End011

腫瘍名 子宮体がん

申請医師 産婦人科

投与スケジュール

DXR+CDDP(AP)			21日毎 PDまで (術後は、原則、6コースまで)	
			1コース	2コース
			1 2 3 4 5	22 ... (day)
アプレピタント		内服	↓↓↓	↓
(Day1:125mg、Day2:80mg、Day3:80mg)				
デカドロン	8 mg	内服	↓↓↓	
① 生理食塩水	500 mL	点滴 60分	↓	↓
② デキサート	9.9 mg	点滴 15分	↓	↓
パロノセトロン	0.75 mg			
生理食塩水	50 mL			
③ 20%マンニトール	300 mL	点滴 60分	↓	↓
④ シスプラチン	50 mg/m ²	点滴 120分	↓	↓
生理食塩水	500 mL			
⑤ アドリアシン	60 mg/m ²	点滴 5分	↓	↓
5%ブドウ糖	50 mL			
⑥ 生理食塩水	500 mL	点滴 120分	↓↓	↓
⑦ ソルデム3A	500 mL	点滴 120分	↓↓	↓
⑧ 生理食塩水	500 mL	点滴 120分	↓↓	↓
⑨ ソルデム3A	500 mL	点滴 120分	↓	
⑩ ヘパフラッシュ100 _{inj}	5 mL	静注	↓↓	↓
(ヘパロック用)				

注意事項

- ・術後及び進行・再発事例に使用
- ・アドリアシンの投与は、総投与量500mg/m²以下とする。
- ・Day1のアプレピタントは投与確定後に服用
- ・シスプラチン投与終了4時間後、尿量1L以下は、ソルアセットF500mLおよびラシックス1Aを使用する。

参考文献

- 1) アドリアシン添付文書2021年9月改訂版、シスプラチン添付文書2022年3月改訂版
- 2) J Clin Oncol, 24, 36-44 (2006).
- 3) J Clin Oncol, 22, 3902-3908 (2004).
- 4) 子宮体がん治療ガイドライン2018年版