

登録日 2008/6/4

登録番号 Eso003

腫瘍名 食道がん

申請科 消化器外科

### 投与スケジュール

FP 9907			術前:21日毎 術後:28日毎 進行再発:28日毎		
			1コース	2コース	
			1 2 3 4 5 6 7	22 ... (day)	
①	ホスアプレピタント 生理食塩水	150 mg 500 mL	点滴 60分	↓	↓
②	デキサート パロノセトロン 生理食塩水	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴 15分	↓	↓
③	20%マンニトール	300 mL	点滴 60分	↓	↓
④	シスプラチン 生理食塩水	80 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴 120分	↓	↓
⑤	5-FU 生理食塩水	800 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴 24時間	↓ ↓ ↓ ↓ ↓	↓
⑥	フィジオ140	500 mL	点滴 3時間	↓	↓
⑦	フィジオ140 <small>(Day2の10時までキープして投与)</small>	1000 mL	点滴 16時間	↓	↓
⑧	フィジオ140 デキサート プリンペラン <small>(1日4本の輸液を24時間でキープして投与)</small>	2000 mL 6.6 mg 20 mg	点滴 24時間	↓ ↓ ↓	
⑨	フィジオ140 プリンペラン <small>(1日4本の輸液を24時間でキープして投与)</small>	2000 mL 20 mg	点滴 24時間		↓ ↓

### 注意事項

- ・適応  
**周術期(術前・術後)事例 ⇒ 術前:21日毎投与 術後:28日毎投与(合併症を考慮して)**  
**進行再発事例 ⇒ 28日毎投与**
- ・対象患者: C-Stage II、III、75歳以下、PS:0~2、未治療、術前化学療法のみ
- ・Day1~2までのフィジオのキープ輸液の点滴時間は目安の投与時間となります。  
(Day1のフィジオ3時間投与後に翌日までキープして投与します。)
- ・尿量はシスプラチン投与後24時間ごとに確認。尿量2000mL未満でDr Call。
- ・体重測定を毎日実施。2kg増加でDr Call

### 参考文献

- 1) 臨床病期Ⅱ期およびⅢ期胸部食道がんに対する5FU+シスプラチン術前化学療法のランダム化比較試験 JCOG9907(Phase III)
- 2) Nobutoshi A, et al, A Randomized trial comparing postoperative adjuvant chemotherapy with cisplatin and 5-fluorouracil versus preoperative chemotherapy for localized advanced squamous cell carcinoma of the thoracic esophagus, Ann Surg Oncol, 19, 68-74 (2012).