

登録日 2022/7/26

登録番号 Eso014

腫瘍名 食道がん

申請科 消化器外科

投与スケジュール

| FP+Nivolumab | | | 28日毎 PDまで | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|---|---------------------------------|-----------|---|---|---|---|---|---|------|----|-----|--|--|--|--|-------|
| | | | 1コース | | | | | | | 2コース | | | | | | | (day) |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 15 | 29 | ... | | | | | |
| ① | ホスアプレピタント 生理食塩水 | 150 mg 500 mL | 点滴 60分 | ↓ | | | | | | | | ↓ | | | | | |
| ② | デキサート パロノセトロン 生理食塩水 | 9.9 mg 0.75 mg 50 mL | 点滴 15分 | ↓ | | | | | | | | ↓ | | | | | |
| ③ | 生理食塩水 (前投薬用フラッシュ) | 50 mL | 点滴 5分 | ↓ | | | | | | | ↓ | ↓ | | | | | |
| ④ | オブジーボ 生理食塩水 | 240 mg 100 mL | 点滴 30分 | ↓ | | | | | | | ↓ | ↓ | | | | | |
| ⑤ | 生理食塩水 (オブジーボ用フラッシュ) | 50 mL | 点滴 5分 | ↓ | | | | | | | ↓ | ↓ | | | | | |
| ⑥ | 20%マンニトール | 300 mL | 点滴 60分 | ↓ | | | | | | | | ↓ | | | | | |
| ⑦ | シスプラチン 生理食塩水 | 80 mg/m ² 500 mL | 点滴 120分 | ↓ | | | | | | | | ↓ | | | | | |
| ⑧ | フルオロウラシル 生理食塩水 | 800 mg/m ² 500 mL | 点滴 24時間 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | | | | ↓ | | | | | |
| ⑨ | フィジオ140 | 500 mL | 点滴 3時間 | ↓ | | | | | | | | ↓ | | | | | |
| ⑩ | フィジオ140 <small>(Day2の10時までキープして投与)</small> | 1000 mL | 点滴 16時間 | ↓ | | | | | | | | ↓ | | | | | |
| ⑪ | フィジオ140 デキサート プリンペラン <small>(1日4本の輸液を24時間でキープして投与)</small> | 2000 mL 6.6 mg 20 mg | 点滴 24時間 | ↓ | ↓ | ↓ | | | | | | | | | | | |
| ⑫ | フィジオ140 プリンペラン <small>(1日4本の輸液を24時間でキープして投与)</small> | 2000 mL 20 mg | 点滴 24時間 | | | | ↓ | ↓ | | | | | | | | | |

注意事項

- ・適応
化学療法歴のない根治切除不能な進行・再発食道がん(扁平上皮癌、腺扁平上皮癌含む):一次治療
- ・Day1~2までのフィジオのキープ輸液の点滴時間は目安の投与時間となります。
(Day1のフィジオ3時間投与後に翌日までキープして投与します。)
- ・尿量はシスプラチン投与後24時間ごとに確認。尿量2000mL未満でDr Call。
- ・体重測定を毎日実施。2kg増加でDr Call
- ・オブジーボは、インラインフィルターを使用(0.2または0.22 μm)。
同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
- ・CVポート等から投与する際、希釈後の最終濃度が1.9mg/mL以上になるよう調製し、
投与時にこれ以上の濃度に希釈しないこと。薬剤投与前後にフラッシュを行うこと。
- ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照

参考文献

1) N Engl J Med, 386, 449-462 (2022).
2) 添付文書(オブジーボ2022年7月改訂版、シスプラチン2022年3月改訂版、フルオロウラシル2022年6月改訂版)