

登録日 2022/7/26

登録番号 Eso015

腫瘍名 食道がん

申請医師 消化器外科

投与スケジュール

Nivolumab+Ipilimumab

42日毎 PDまで

			1コース		2コース		
			1	22	43	...	(day)
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL 点滴 5分	↓	↓	↓		
②	オプジーボ 生理食塩水	360 mg 点滴 30分 100 mL	↓	↓	↓		
③	生理食塩水 (オプジーボ用フラッシュ)	50 mL 点滴 30分	↓		↓		
④	生理食塩水 (オプジーボ用フラッシュ)	50 mL 点滴 5分		↓	↓		
⑤	ヤーボイ 生理食塩水	1 mg/kg 点滴 30分 20 mL	↓		↓		
⑥	生理食塩水 (ヤーボイ用フラッシュ)	50 mL 点滴 5分	↓		↓		

注意事項

- ・適応
化学療法歴のない根治切除不能な進行・再発食道がん(扁平上皮癌、腺扁平上皮癌含む):一次治療
- ・オプジーボはインラインフィルターを使用(0.2または0.22 μm)
- ・CVポート等から投与する際、希釈後の最終濃度が1.9mg/mL以上になるよう調製し、投与時にこれ以上の濃度に希釈しないこと。薬剤投与前後にフラッシュを行うこと。
- ・ヤーボイはインラインフィルターを使用(0.2~1.2 μm)
同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
- ・ヤーボイの希釈後の最終濃度は1~4mg/mLの濃度に希釈し投与する。
生食50mLのボトルから30mL抜いて調製する。
- ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。

参考文献

- 1) N Engl J Med, 386, 449-462 (2022).
- 2) 添付文書(オプジーボ2022年7月改訂版、ヤーボイ2022年7月改訂版)