

登録日 2020/8/7

登録番号 CD001

疾患名 キャッスルマン病

申請診療科 糖尿病・内分泌内科

投与スケジュール

Tocilizumab 14日毎

| ① | 生理食塩水 50 mL | 点滴 5分 | (プライミング用) |
|---|---------------|--------|---------------|
| ② | アクテムラ 8 mg/kg | 点滴 60分 | 生理食塩水 100 mL |
| ③ | 生理食塩水 50 mL | 点滴 5分 | (フラッシュ用) (全開) |

投与開始時には緩徐に点滴静注を行い、患者の状態を十分に観察し、異常がないことを確認後、点滴速度を速め、1時間程度で投与する。

注意事項

- ・体重25kg以下の場合は50mL、25kgを超える場合は100～250mLの日局生理食塩水に加え、希釈する。
- ・本剤は無菌・パイロジェンフリーのインラインフィルター（ポアサイズ1.2ミクロン以下）を用い、独立したラインにて投与すること。
- ・症状により1週間まで投与間隔の短縮が可能
- ・投与毎にCRPを測定すること
- ・B型肝炎の再活性化に対するフローを参照し対応すること
- ・結核既往を確認する（CT画像およびT-スポットどちらか陽性であれば、呼吸器内科コンサルト）。
- ・T-Cho, TG, LDLを投与開始3か月後を目安に確認すること
- ・心疾患を合併している患者には定期的に心電図を行うこと

参考文献

- 1) 添付文書
- 2) 適正使用ガイド
- 3) BLOOD, 106, 2627-2632 (2005).
- 4) 大阪大学大学院医学系研究科 呼吸器・免疫内科学 資料