

登録日 2012/6/14

レジメン名 Gas017

腫瘍名 胃がん

申請診療科 消化器外科

投与スケジュール

| CPT-11 biweekly | | | 28日毎 × PDまで | | | | |
|-----------------|----------|-----------------------|-------------|-----|------|----|--------------|
| | | | 1コース | | 2コース | | |
| | | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 ... (day) |
| ① | デキサート | 9.9 mg | 点滴 | 15分 | ↓ | ↓ | ↓ |
| | パロノセトロン | 0.75 mg | | | ↓ | ↓ | ↓ |
| | 生理食塩水 | 50 mL | | | ↓ | ↓ | ↓ |
| ② | イリノテカン | 150 mg/m ² | 点滴 | 90分 | ↓ | ↓ | ↓ |
| | 5%ブドウ糖 | 500 mL | | | ↓ | ↓ | ↓ |
| ③ | 生理食塩水 | 50 mL | 点滴 | 5分 | ↓ | ↓ | ↓ |
| | (フラッシュ用) | | 全開 | | ↓ | ↓ | ↓ |

注意事項

- ・本治療は添付文書を参考に実臨床に適應するために作成されたレジメンです。
 - ・イリノテカンの用量が150mg/m²と他のレジメンに比較し高いことから、安全性を確保するためにUGT1A1の遺伝子変異検査を実施することになっています。
- ダブルヘテロ、ホモ型では減量が必要になります。

参考文献

- ・イリノテカン「タイホウ」添付文書 2011年11月改訂版
- ・Kei Muro *et al.*, Irinotecan plus S-1(IRIS) versus fluorouracil and folinic acid plus irinotecan(FOLFIRI) as second-line chemotherapy for metastatic colorectal cancer: a randomised phase 2/3 non-inferiority study (FIRIS study), *Lancet Oncol.*, 11, 853-860, 2010.
- ・NCCN Guidelines Version 1. 2012 Gastric Cancer
- ・Koji Okabayashi *et al.*, Combination chemotherapy of biweekly irinotecan (CPT-11) plus tegafur/uracil (UFT) and leucovorin (LV) for patients with metastatic colorectal cancer: phase I / II study in Japanese patients, *Cancer Chemother. Pharmacol.*, 63, 501-507, 2009.