

登録日 2018/4/24

登録番号 Gas026

腫瘍名 胃がん

申請診療科 消化器外科

投与スケジュール

SOX+Tmab			21日毎 PDまで	
			1コース	2コース
			1 8 15	22 ... (day)
①	デキサート パロノセトロン 5%ブドウ糖	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴 15分	↓
②	生理食塩水 (前投薬フラッシュ用)	50 mL	点滴 5分	↓
③	トラスツズマブBS 蒸留水 生理食塩水	8 mg/kg 20~40 mL 250 mL	点滴 30分	↓
初回投与量:8mg/kg、2回目以降投与量:6mg/kg 初回90分投与、2回目以降30分に短縮可能				
④	生理食塩水 (トラスツズマブ用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分	↓
⑤	オキサリプラチン 5%ブドウ糖	130 mg/m ² 250 mL	点滴 120分	↓
⑥	5%ブドウ糖 (オキサリプラチン用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓
⑦	S-1	80 mg/m ²	経口 朝、夕	Day 1~14 Day22 ~

注意事項

・胃癌治療ガイドライン2018年版には、推奨レジメンが使用困難な時に、必要な患者に使用できるレジメンとしてカテゴリー化されている。
・病理結果にてHER2蛋白陽性(3+または2+かつFISH法で陽性の場合)
・トラスツズマブは、投与予定日より1週間を超えた後に投与する際、改めて初回量で投与する。
・トラスツズマブ投与の際には、心エコーによる心機能を確認する。
(EF>50%以上。低下時の対応は適正指導ガイド参照)
モニタリングの頻度は、通常患者では12週毎、無症候性心機能障害者では6~8週毎に行う。

参考文献

1) 日本胃癌学会編集:胃癌治療ガイドライン2018年1月改訂 第5版
2) A phase II study of trastuzumab plus S-1 and oxaliplatin for HER2-positive advanced gastric cancer, J Clin Oncol, 35, 15, suppl.4059, (2017).