

登録日 2017/8/18

登録番号 H&N011

腫瘍名 頭頸部がん

申請医師 口腔外科、耳鼻科

### 投与スケジュール

Nivolumab			14日毎 PDまで	
			1コース	2コース
			1	15 ... (day)
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL 点滴 5分	↓	↓
②	オプジーボ 生理食塩水	240 mg 100 mL 点滴 30分	↓	↓
③	生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL 点滴 5分	↓	↓

### 注意事項

・適応: 再発または遠隔転移を有する頭頸部がん  
【2次治療以降: プラチナ製剤を含む化学療法(根治目的又は術後化学放射線療法を含む)】

#### 【調製上及び使用上の注意】

- ・希釈後の最終濃度は0.35mg/mL以上が必要 (総液量は60mL以上が必要)  
振とうにより凝集体が認められることがあるため、激しく振ったり、攪拌しない。
- ・インラインフィルターを使用(0.2または0.22  $\mu$ m)  
同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
- ・CVポート等から投与する際、希釈後の最終濃度が1.9mg/mL以上になるよう調製し、  
投与時にこれ以上の濃度に希釈しないこと。薬剤投与前後にフラッシュを行うこと。
- ・血管外漏出リスクは非炎症性に相当。
- ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。

### 参考文献

- 1) オプジーボ点滴静注 添付文書 2018年8月改訂版
- 2) オプジーボ適正使用ガイド 2017年3月作成
- 3) R.L. Ferris, et al, Nivolumab for Recurrent Squamous-Cell Carcinoma of the Head and Neck, N Engl J Med, 375, 1856-1867 (2016).