

登録日 2018/5/22

登録番号 H&N012

腫瘍名 頭頸部がん

申請科 口腔外科

投与スケジュール

PTX+CBDCA+Cmab			21日毎 X 6コース (アービタックスのみはPDまで継続)			
			1コース		2コース	
			1	8	15	22 ... (day)
①	デキサート パロノセトロン ファモチジン ポララミン 生理食塩水	9.9 mg 0.75 mg 20 mg 5 mg 50 mL	点滴 15分	↓	↓	↓
②	デキサート ポララミン 生理食塩水	3.3 mg 5 mg 50 mL	点滴 30分		↓	
③	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	100 mg/m <sup>2</sup> 250	点滴 60分	↓	↓	↓
④	カルボプラチン 5%ブドウ糖液	AUC 2.5 250 mL	点滴 60分	↓	↓	↓
⑤	生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓	↓	↓
⑥	アービタックス 生理食塩水 (初回アービタックス400mg/m <sup>2</sup> , 120分投与)	250 mg/m <sup>2</sup> 250 mL	点滴 60分	↓	↓	↓
⑦	生理食塩水	250 mL	点滴 60分	↓	↓	↓

注意事項

- ・アービタックスは初回は**400mg/m<sup>2</sup>を120分**で投与
- ・最大6コース3剤併用を実施し、その後、アービタックス単剤をPDまで継続する。
- ・インラインフィルターを使用
- ・減量基準の参考値(参考文献からの引用)  
各薬剤減量レベル: レベル0 (パクリタキセル: 100mg/m<sup>2</sup>, カルボプラチン: AUC2.5, アービタックス: 250mg/m<sup>2</sup>)  
レベル1 (パクリタキセル: 80mg/m<sup>2</sup>, カルボプラチン: AUC2.0, アービタックス: 200mg/m<sup>2</sup>)  
レベル2 (パクリタキセル: 60mg/m<sup>2</sup>, カルボプラチン: AUC1.6, アービタックス: 150mg/m<sup>2</sup>)
- セツキシマブはGrade3以上の皮膚障害で減量
- パクリタキセル、カルボプラチンは、下記の項目で減量。
  - ・Grade4の好中球減少、FN発症、Grade3以上の血小板減少、Grade3以上の非血液毒性(悪心嘔吐を除く)
  - ・Grade2の神経障害(パクリタキセルのみ該当)

参考文献

1) Annal of oncology online 2 february 2018.