

登録日 2020/11/24

登録番号 ScI011

腫瘍名 小細胞肺がん

申請医師 呼吸器内科

投与スケジュール

CBDCA+VP-16+Durvalumab 21日毎 進展型の初回治療は4コース

				1コース			2コース		(day)
				1	2	3	22	...	
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴 5分	↓			↓		
②	イミフィンジ 生理食塩水	1500 mg 250 mL	点滴 60分	↓			↓		
③	生理食塩水 (イミフィンジ用フラッシュ)	100 mL	点滴 60分	↓			↓		
④	デキサート パロノセトロン 生理食塩水	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴 15分	↓			↓		
⑤	デキサート 生理食塩水	6.6 mg 50 mL	点滴 15分		↓ ↓				
⑥	カルボプラチン 生理食塩水	AUC 6 250 mL	点滴 60分	↓			↓		
⑦	エトポシド 5%ブドウ糖	100 mg/m ² 500 mL	点滴 90分	↓ ↓ ↓			↓		
⑧	生理食塩水 (エトポシド用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓ ↓ ↓			↓		

5コース目から維持療法として イミフィンジ 28日毎 をPDまで継続

				5コース			6コース		(day)
				1	2	3	29	...	
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴 5分	↓			↓		
②	イミフィンジ 生理食塩水	1500 mg 250 mL	点滴 60分	↓			↓		
③	生理食塩水 (イミフィンジ用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓			↓		

注意事項

- ・本レジメンは体重30kg以上に使用すること。
- ・エトポシドは、溶解時濃度0.4mg/mL以下とすること。
- ・イミフィンジは、体重30kg以下の場合の1回投与量は20mg/kgとする。
- ・イミフィンジは、インラインフィルターを使用(0.2または0.22 μm)
- ・CBDCA量(mg) = AUC X (GFR + 25) GFRはCLcrで近似する。
- ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。

参考文献

1) Lancet, 394, 1929-1939 (2019).