

登録日	2008/4/18
腫瘍名	非小細胞肺癌

レジメン名	Nsci024
申請診療科	呼吸器内科

投与スケジュール

★CDDP+PEM+Bmab(short hydration)			21日毎 × 4-6C	
			1コース	2コース
			1	22
			2	...
			3	(day)
			4	
アプレピタントカプセル	125 mg	内服	↓	↓
* 確定後内服				
アプレピタントカプセル	80 mg	内服	↓	↓
			↓	↓
デカドロン	8 mg	内服	↓	↓
			↓	↓
① KCL注	10 mEq	点滴 60分	↓	↓
硫酸Mg補正液	10 mEq			
生理食塩水	500 mL			
* 病棟に払い出し				
② ベバシズマブBS	15 mg/kg	点滴 30分	↓	↓
生理食塩水	100 mL			
(初回90分、2回目60分、3回目以降30分で投与)				
③ 生理食塩水	50 mL	点滴 5分	↓	↓
(フラッシュ用)				
④ デキサート	9.9 mg	点滴 15分	↓	↓
パロノセトロン	0.75 mg			
生理食塩水	50 mL			
⑤ ペメトレキセド	500 mg/m ²	点滴 10分	↓	↓
生理食塩水	100 mL			
⑥ 20%マンニトール	300 mL	点滴 30分	↓	↓
⑦ シスプラチン	75 mg/m ²	点滴 60分	↓	↓
生理食塩水	500 mL			
⑧ 生理食塩水	500 mL	点滴 60分	↓	↓

注意事項:

- ・適応条件: PS0-1、Ccr > 60ml/min、心機能保持(LvEF > 60%)
- ・シスプラチン投与後、2時間で尿測1L以下、尿回数3回未満、体重2kg増加 → ラシックス20mg追加投与を検討
- ・投与当日はシスプラチン終了まで1Lの経口補水
- ・本レジメン開始7日前よりパンビタン1g(葉酸として0.5mg)連日内服とメチコパール注2A(ビタミンB12として1mg)9週間毎をペメトレキセド最終投与22日目まで投与する。

参考文献: