

登録日 2016/1/18

登録番号 NscI027

腫瘍名 非小細胞肺癌

申請医師 呼吸器内科

投与スケジュール

Nivolumab			14日毎 × PDまで	
			1コース	2コース
			1	15 ... (day)
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL 点滴 5分	↓	↓
②	オプジーボ 生理食塩水	240 mg 点滴 30分 100 mL	↓	↓
③	生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL 点滴 5分	↓	↓

注意事項

【適応】

・切除不能な進行・再発の非小細胞肺癌、扁平上皮癌および非扁平上皮癌(2次治療以降)

【調製上及び使用上の注意】

- ・希釈後の最終濃度は0.35mg/mL以上が必要 (総液量は60mL以上が必要)
振とうにより凝集体が認められることがあるため、激しく振ったり、攪拌しない。
- ・インラインフィルターを使用(0.2または0.22 μ m)
同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
- ・CVポート等から投与する際、希釈後の最終濃度が1.9mg/mL以上になるよう調製し、
投与時にこれ以上の濃度に希釈しないこと。薬剤投与前後にフラッシュを行うこと。
- ・血管外漏出リスクは非炎症性に相当。
- ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。

参考文献

- 1) オプジーボ点滴静注 添付文書 2018年8月改訂版
- 2) オプジーボ適正使用ガイド 2016年1月作成
- 2) Nivolumab versus docetaxel in advanced squamous-cell non-small-cell lung cancer, N Eng J Med, 373, 123-135 (2015).
- 3) Nivolumab versus docetaxel in advanced nonsquamous non-small-cell lung cancer, N Eng J Med, 373, 1627-1639 (2015).