

登録日 2021/3/22

登録番号 Nsc1043

腫瘍名 非小細胞肺がん

申請医師 呼吸器内科

投与スケジュール

CBDCA+PEM+Atezolizumab				21日毎 × 4~6コース	
				1コース	2コース
				1	22
				8	...
				15	(day)
①	デキサート パロノセトロン 生理食塩水	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴 15分	↓	↓
②	生理食塩水 (前投薬用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓	↓
③	テセントリク 生理食塩水	1200 mg 100 mL	点滴 30分	↓	↓
				初回60分、2回目以降30分に短縮可	
④	生理食塩水 (テセントリク用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓	↓
⑤	ペメトレキセド 生理食塩水	500 mg/m ² 100 mL	点滴 10分	↓	↓
⑥	カルボプラチン 5%ブドウ糖	AUC 6 250 mL	点滴 60分	↓	↓
⑦	生理食塩水 (カルボプラチン用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓	↓
5~7コース目から、PEM+AtezolizumabのみPDまで継続					
				5コース	6コース
				1	22
				8	...
				15	(day)
①	デキサート 生理食塩水	6.6 mg 50 mL	点滴 15分	↓	↓
②	生理食塩水 (前投薬用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓	↓
③	テセントリク 生理食塩水	1200 mg 100 mL	点滴 30分	↓	↓
				初回60分、2回目以降30分に短縮可	
④	生理食塩水 (テセントリク用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓	↓
⑤	ペメトレキセド 生理食塩水	500 mg/m ² 100 mL	点滴 10分	↓	↓
⑥	生理食塩水 (ペメトレキセド用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓	↓

注意事項

- ・適応：扁平上皮癌以外
- ・テセントリクはインラインフィルターを使用する。
- ・本治療開始7日以上前から葉酸0.5mgを連日経口投与する。レジメンを中止または終了する場合には、最終投与日から22日目まで可能な限り葉酸を投与する。
- ・少なくとも本治療開始7日前に、ビタミンB12として1回1mgを筋肉内投与する。
- ・治療期間中及び投与中止後22日目まで9週ごとに1回投与する。
- ・CBDCA量(mg) = AUC X (GFR + 25) GFRはCLcrで近似する。
- ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。

参考文献

- 1) J Thorac Oncol, 16, 653-664 (2021).
- 2) テセントリク添付文書2022年2月改訂版
- 3) ペメトレキセド添付文書2021年6月改訂版
- 4) カルボプラチン添付文書2021年8月改訂版