


登録日 2018/9/11

登録番号 Meso004

腫瘍名 悪性中皮腫

申請医師 呼吸器内科

## 投与スケジュール



## 注意事項

### 【適応】

- 切除不能な進行・再発の悪性中皮腫の2次治療以降

### 【調製上及び使用上の注意】

- 希釈後の最終濃度は0.35mg/mL以上が必要（総液量は60mL以上が必要）  
振とうにより凝集体が認められることがあるため、激しく振ったり、攪拌しない。
- インラインフィルターを使用(0.2または0.22 μm)  
同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
- CVポート等から投与する際、希釈後の最終濃度が1.9mg/mL以上になるよう調製し、  
投与時にこれ以上の濃度に希釈しないこと。薬剤投与前後にフラッシュを行うこと。
- 血管外漏出リスクは非炎症性に相当。
- 免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。

## 参考文献

- 1) オプジーボ点滴静注 添付文書 2018年8月改訂版
- 2) Yasushi GOTO, et al, A Phase II study of nivolumab: a multicenter, open-label, single arm study in malignant pleural mesothelioma(MPM); MERIT.
- 3)ONO-4538-41試験概要資料(評価資料)