

登録日 2021/7/27

登録番号 Meso005

腫瘍名 悪性胸膜中皮腫

申請医師 呼吸器内科

投与スケジュール

Nivolumab+Ipilimumab			42日毎 × PDまたは 原則、最長24ヵ月間			
			1コース		2コース	
			1	22	43	...
			(day)			
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL 点滴 5分	↓	↓	↓	
②	オプジーボ 生理食塩水	360 mg 点滴 30分 100 mL	↓	↓	↓	
③	生理食塩水 (オプジーボ用フラッシュ)	50 mL 点滴 30分	↓		↓	
④	生理食塩水 (オプジーボ用フラッシュ)	50 mL 点滴 5分 (全開)		↓		
⑤	ヤーボイ 生理食塩水	1 mg/kg 点滴 30分 20 mL	↓		↓	
⑥	生理食塩水 (ヤーボイ用フラッシュ)	50 mL 点滴 5分	↓		↓	

注意事項

- 【適応】
 - ・切除不能な進行・再発悪性胸膜中皮腫(原則、1次治療)
- 【投与延期、中止基準】
 - ・適正使用ガイド参照
- 【調製上及び使用上の注意】
 - ・オプジーボはインラインフィルターを使用(0.2または0.22 μm)
 - ・CVポート等から投与する際、希釈後の最終濃度が1.9mg/mL以上になるよう調製し、投与時にこれ以上の濃度に希釈しないこと。薬剤投与前後にフラッシュを行うこと。
 - ・ヤーボイはインラインフィルターを使用(0.2~1.2 μm)
 - ・同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
 - ・ヤーボイの希釈後の最終濃度は1~4mg/mLの濃度に希釈し投与する。
生食50mLのボトルから30mL抜いて調製する。
 - ・血管外漏出リスクは非炎症性に相当。
 - ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。

参考文献

- 1) Lancet, 397, 375-386 (2021).
- 2) オプジーボ点滴静注 添付文書 2021年5月改訂版
- 3) ヤーボイ点滴静注 添付文書 2021年6月改訂版
- 4) 肺癌学会胸膜中皮腫診療ガイドライン2020年版改訂 ve1.1
- 5) 最適使用推進ガイドライン