

登録日 2019/3/26

登録番号 MSI001

腫瘍名 MSI-High固形がん

申請医師 腫瘍内科

投与スケジュール

Pembrolizumab			21日毎 PDまで	
			1コース	2コース
			1	22 ... (day)
① 生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴 5分	↓	↓
② キイトルーダ 生理食塩水	200 mg 100 mL	点滴 30分	↓	↓
③ 生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL	点滴 5分 全開投与可	↓	↓

注意事項

【適応】

- ・高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形がん(2次治療以降に使用)
- ・MSI-Highを有する結腸癌・直腸癌(1次治療)

【注意事項】

- ・個々の症例に対する本剤の適応は、各診療科で十分検討すること。
- ・減量基準がないため、投与量は200mgの固定用量による投与
- ・インラインフィルターを使用(0.2~5 μ m)。
同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
- ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照
- ・希釈後の最終濃度は1~10mg/mLとする。

参考文献

- 1) キイトルーダ点滴静注 添付文書 2021年8月改訂版
- 2) 厚生労働省, 最適使用推進ガイドラインペムブロリズマブ, 2018年12月発刊(2021年8月改訂)