

登録日 2020/12/22

登録番号 MSI002

腫瘍名 MSI-High固形がん

申請医師 腫瘍内科

### 投与スケジュール

Pembrolizumab			42日毎 PDまで	
			1コース	2コース
			1	43 ... (day)
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL 点滴 5分	↓	↓
②	キイトルーダ 生理食塩水	400 mg 点滴 30分 100 mL	↓	↓
③	生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL 点滴 5分 全開投与可	↓	↓

### 注意事項

<p><b>【適応】</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)を有する固形がん(2次治療以降に使用)</li><li>・MSI-Highを有する結腸癌・直腸癌(1次治療)</li></ul> <p><b>【注意事項】</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>・個々の症例に対する本剤の適応は、各診療科で十分検討すること。</li><li>・減量基準がないため、投与量は200mgの固定用量による投与</li><li>・インラインフィルターを使用(0.2~5<math>\mu</math>m)。</li><li>同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。</li><li>・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照</li><li>・希釈後の最終濃度は1~10mg/mLとする。</li></ul>
---

### 参考文献

<p>1) キイトルーダ点滴静注 添付文書 2021年8月改訂版</p> <p>2) 厚生労働省, 最適使用推進ガイドラインペムブロリズマブ, 2018年12月(2021年8月改訂)</p>
---