

登録日 2010/11/29

登録番号 Ova012

腫瘍名 卵巣がん

申請診療科 産婦人科

投与スケジュール

PLD+CBDCA			28日毎	
			1コース	2コース
			1	29 ... (day)
①	デキサート パロノセトン 生理食塩水	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴 15分	↓
②	ドキシル 5%ブドウ糖	30 mg/m ² 250 mL	点滴 90分 投与量が90mg以上の時は溶媒を500mLとする	↓
③	カルボプラチン 5%ブドウ糖	AUC 5 250 mL	点滴 60分	↓
④	生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓

注意事項

- ・**ドキシル投与量が90mg以上の時は、溶媒を500mLとする。**
- ・Infusion reaction発現の危険性を最小限にするため、ドキシルの投与速度は、1mg/minを超えないこと。
- ・心筋障害の投与中止の目安(ドキシル)
 - ①LVEF値が45%を下回った時。
 - ②投与前LVEF値より20%以上の低下がみられた時。
- ・初回投与時のLVEF値は50%以上が目安(ドキシル)。
- ・ドキシルによるInfusion reaction発現後に投与を再開する場合、0.7mg/min以下になるよう投与速度を遅くする。
- ・ドキシルの投与ルートにインラインフィルターを使用しない(リポソーム製剤のため、粒子が詰まるため)
- ・Calvertの式: CBDCA量(mg) = AUC X (GFR + 25)

参考文献

Pegylated Liposomal Doxorubicin and Carboplatin Compared With Paclitaxel and Carboplatin for Patients With Platinum-Sensitive Ovarian Cancer in Late Relapse. J Clin Oncol 28:3323-3329,2010