

登録日 2009/ /

登録番号


腫瘍名 小児急性リンパ性白血病

申請診療科 小児科

投与スケジュール

強化療法Aブロック

28日



6-MP	60 mg/m ² /d(最大 80mg) 経口分 1 就寝前投与 好中球 0/μl になるまで投与し続ける。	day1-14
Cyclophosphamide	1g/m ² , 2h 点滴静注	day1
Ara-C	75 mg/m ² 静注 好中球 0/μl になるまで投与し続ける。	day1-5, day8-12
DIT	HDC+MTX 髄注 (投与量は年齢別基準 6.3.6.参照)	day1, 8

	1歳	2歳	3歳以上
MTX	7.5 mg	10 mg	12.5 mg
HDC	15 mg	20 mg	25 mg

(髄注薬剤の溶解方法)
MTX は注射用水で溶解し 2.5mg/mL とする。
HDC は必要量をシリンジに取る。
3 剤を 1 本のシリンジにまとめて髄注する。

注意事項

標準的には治療開始後 25 週から開始可能である
開始予定 3 日前以内の検査にて白血球数 1,500/μl 以上、血小板数 8 万/μl 以上。

参考文献

東京小児がん研究グループ
小児急性リンパ性白血病に対する寛解導入療法と早期強化療法の有効性・安全性に関する検討試験実施計画書
TCCSG ALL L04-16 改訂第2版 (L07-16-02)