


登録日 2012/6/26

登録番号 Pro005

腫瘍名 前立腺がん

申請診療科 泌尿器科

投与スケジュール



注意事項

【適応】前立腺がん、皮下注(静脈注射では血栓症を誘発する)

【投与時の注意】

- ・25Gの針またはそれよりも太いものを用いる。
- ・投与部位：上腕部、腹部、臀部の皮下。
- ・投与部位は、毎回変更し、同一部位への反復投与は行わないこと。
- ・注射針が血管内に入っていないことを確認する。
- ・注射部位はもまない。
- ・初回投与初期に、血中テストステロン濃度の上昇に伴って、骨性疼痛の一過性の増悪や尿路閉塞、脊髄圧迫がみられることがあり、その際には対症療法を検討する（投与開始1ヵ月間は十分観察を行う）。
- ・キット品は、注射針を上にしてプランジャーーロッドを押して、懸濁用液全量を粉末部に移動させ、泡立てないよう注意して、十分に懸濁して用いる。

【その他】

- ・本剤は用時調製し、懸濁後は直ちに使用する。
- ・うつ状態や心不全が現れることがあるので、十分に観察すること。
- ・糖尿病の発症や増悪、下垂体卒中が報告されている（頻度不明）。

参考文献

リュープリン注射用 添付文書 2011年5月改訂版