

登録日 2020/12/22

登録番号 Renal003

腫瘍名 腎細胞がん

申請医師 泌尿器科

投与スケジュール

Nivolumab維持療法時		28日毎 PDまで	
		1コース	2コース
		1	29 ... (day)
① 生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴 5分	↓
② オプジーボ	480 mg	点滴 30分	↓
生理食塩水	76 mL		↓
③ 生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL	点滴 5分	↓

注意事項

【適応】

- ・根治切除不能な転移性腎細胞がん(1次治療)。**前治療歴がないこと。**
- ・IMDCリスク分類でintermediate 又はpoorリスクの患者を対象とする。

【投与延期、中止基準】

- ・適正使用ガイド参照

【調製上及び使用上の注意】

- ・本治療は**4コース実施後、Nivolumab単剤治療(維持療法)へ移行する。**
- ・調製時は静かに転倒混和する。
- ・オプジーボはインラインフィルターを使用**(0.2または0.22 μ m)**
- ・CVポート等から投与する際、希釈後の最終濃度が1.9mg/mL以上になるよう調製し、投与時にこれ以上の濃度に希釈しないこと。薬剤投与前後にフラッシュを行うこと。
- ・ヤーポイはインラインフィルターを使用**(0.2~1.2 μ m)**
- ・同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
- ・ヤーポイの希釈後の最終濃度は1~4mg/mLの濃度に希釈し投与する。
生食50mLのボトルから30mL抜いて調製する。
- ・血管外漏出リスクは非炎症性に相当。
- ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。

参考文献

- 1) New Engl J Med, 378, 1277-1290 (2018).
- 2) オプジーボ点滴静注 添付文書 2020年11月改訂版
- 3) 最適使用推進ガイドライン ニボルマブ 腎細胞癌 2018年8月改訂