

登録日 2020/9/29

登録番号 Renal004

腫瘍名 腎細胞がん

申請医師 泌尿器科

投与スケジュール

Pembrolizumab+Axitinib			21日毎 PDまで	
			1コース	2コース
			1	22 ... (day)
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL 点滴 5分	↓	↓
②	キイトルーダ 生理食塩水	200 mg/body 点滴 30分 100 mL	↓	↓
③	生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL 点滴 5分	↓	↓
④	インライタ	1回5mg 1日2回 経口	Day1~21	
			* 基準に応じて増減可	

注意事項

- ・切除不能または転移性の腎細胞がん(1次治療)
- 【調製上及び使用上の注意】
- ・キイトルーダは減量基準がないため、投与量は200mgの固定用量による投与
 - ・インライタは副作用や忍容性に応じて、増減可能(方法は添付文書及び適正使用ガイド参照)。
 - ・インラインフィルターを使用(0.2~5 μ m)。
同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
 - ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照
 - ・キイトルーダは、希釈後の最終濃度は1~10mg/mLとする。

参考文献

- 1) キイトルーダ 添付文書 2020年8月改訂版
- 2) インライタ 添付文書 2019年12月改訂版
- 3) N Engl J Med, 380, 1116-1127 (2019).