

登録日 2018/10/31

登録番号 CTCL001

腫瘍名 皮膚T細胞性リンパ腫

申請診療科 皮膚科

投与スケジュール

| Mogamulizumab | | | 28日毎×PDまで(最大12カ月間) | | | | |
|---------------|------------------------|-------------------------|--------------------|----|------|-----|---|
| 1コース目 | | | 1コース (day) | | | | |
| | | | 1 | 8 | 15 | 22 | |
| ① | デキサート ポラミン 生理食塩水 | 9.9 mg 5 mg 50 mL | 点滴 30分 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| ② | 生理食塩水 | 50 mL | 点滴 5分 (全開) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| ③ | ポテリジオ 生理食塩水 | 1 mg/kg 250 mL | 点滴 120分 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| ④ | 生理食塩水 フラッシュ | 50 mL | 点滴 5分 (全開) | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 2コース目以降 | | | 2コース | | 3コース | | |
| | | | 1 | 15 | 29 | ... | |
| ① | デキサート ポラミン 生理食塩水 | 9.9 mg 5 mg 50 mL | 点滴 30分 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| ② | 生理食塩水 | 50 mL | 点滴 5分 (全開) | ↓ | ↓ | ↓ | |
| ③ | ポテリジオ 生理食塩水 | 1 mg/kg 250 mL | 点滴 120分 | ↓ | ↓ | ↓ | |
| ④ | 生理食塩水 フラッシュ | 50 mL | 点滴 5分 (全開) | ↓ | ↓ | ↓ | |

注意事項

- ・1コース以上の全身療法を受けた再発または難治性のCTCLの患者が対象
- ・調製時の溶解液には生理食塩液以外使用しないこと
- ・インフュージョンリアクション対策に点滴開始前にカロナール1回400mg使用
- ・前投薬のステロイド(デキサート)は、インフュージョンリアクションの発現時期を考慮して主治医判断で増減可能
- ・B型肝炎再活性化のスクリーニングが必要
- ・腫瘍崩壊症と結核のスクリーニングを行う(LDH、Ca、P、尿酸、CT画像、T-スポット)
- ・ニューモシスチス肺炎予防にST合剤(1日1錠または1包を連日あるいは1日2回4錠を週2回)を予防内服する。
ST合剤でアレルギー様症状を有する場合は、ペンタミジンイセチオン酸塩(適切な用量)の投与で可。
- ・結核既往を確認する(CT画像およびT-スポットどちらか陽性であれば、呼吸器内科コンサルト)。
結核既往あれば抗結核薬(イソニアジド等)の予防内服を行う。

参考文献

- 1) Lancet Oncol. 19, 1192-1204 (2018).
- 2) ポテリジオ添付文書・ポテリジオ適性使用ガイド2018年版