

登録日 2012/2/14

登録番号 Uro007

腫瘍名 尿路上皮がん

申請医師 泌尿器科

### 投与スケジュール

PTX+GEM			21日毎×PDまで		
			1コース		2コース
			1	8	22 ... (day)
①	デキサート ファモチジン ポララミン 生理食塩水	19.8 mg 20 mg 5 mg 50 mL	点滴 15分	↓	↓
②	デキサート 生理食塩水	6.6 mg 50 mL	点滴 15分	↓	↓
③	パクリタキセル 5%ブドウ糖	175 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴 3時間	↓	↓
④	ゲムシタピン 生理食塩水	1000 mg/m <sup>2</sup> 100 mL	点滴 30分	↓ ↓	↓
⑤	生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓ ↓	↓

### 注意事項

- ・輸液ライン: 0.22 μmのインラインフィルターを使用すること。
- ・尿路上皮がんにて2nd line として使用。

### 参考文献

Randomized phase III trial of 2nd line gemcitabine and paclitaxel chemotherapy in patients with advanced bladder cancer: short-term versus prolonged treatment [German Association of Urological Oncology (AUO) trial AB 20/99] . Annals of Oncology, 22, 288-294, 2011