

登録日 2017/12/26

登録番号 Uro010

腫瘍名 尿路上皮がん

申請医師 泌尿器科

投与スケジュール

GEM+CBDCA			21日毎					
			1コース	2コース				
			1	8	22	...	(day)	
①	デキサート	9.9 mg	点滴 15分	↓		↓		
	パロノセトロン	0.75 mg						
	生理食塩水	50 mL						
②	デキサート	6.6 mg	点滴 15分		↓			
	生理食塩水	50 mL						
③	ゲムシタビン	1000 mg/m ²	点滴 30分	↓	↓	↓		
	生理食塩水	100 mL						
④	カルボプラチン	AUC 5	点滴 60分	↓		↓		
	5%ブドウ糖	250 mL						
⑤	生理食塩水	50 mL	点滴 5分	↓	↓	↓		
	(フラッシュ用)		(全開)					

注意事項

【適応】進行、再発の尿路上皮癌(膀胱癌)

【投与方法、注意点】

- ・腎機能低下事例などシスプラチンが不適応と考えられる事例に用いる。
- ・カルボプラチン用量＝目標AUC×(GFR+25) (カルバートの式を使用)
- ・臨床試験上は、6コース実施。

【投与・中止・減量基準】臨床試験情報¹⁾からの参考値

投与基準

Day1 好中球数1500/mm³、血小板数:10万/mm³→治療延期(中止)

Day8 好中球数1000~1500/mm³または血小板数:7.5~9.9万/mm³→ゲムシタビン75%に減量して投与

参考文献

1) J. Carles, *et al*, *Oncology*, 59, 24-27(200).

2) Luigi dogliotti, *et al*, *European Urology*, 52, 134-141 (2007).

3) Andrea Necchi, *et al*, *Clinical Genitourinary Cancer*, 15, 23-30 (2016).

4) Andrew G. Robinson *et al*, *Clinical Genitourinary Cancer*, 15, 535-541 (2017).

5) NCCN guideline 2017