

登録日 2022/4/26

登録番号 Uro015

腫瘍名 尿路上皮がん

申請医師 泌尿器科

投与スケジュール

Nivolumab 28日毎 PDまたは12ヵ月間まで

投与内容	用量	点滴時間	コース
① 生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴 5分	1コース / 2コース
② オプジーボ 生理食塩水	480 mg 76 mL	点滴 30分	1コース / 2コース
③ 生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL	点滴 5分	1コース / 2コース

注意事項

【適応】

- 術後補助療法
- プラチナ製剤による治療が可能な場合、これらの治療を優先すること。

【調製上及び使用上の注意】

- 希釈後の最終濃度は0.35mg/mL以上が必要（総液量は60mL以上が必要）
振とうにより凝集体が認められることがあるため、激しく振ったり、攪拌しない。
- インラインフィルターを使用(0.2または0.22 μ m)
同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
- CVポート等から投与する際、希釈後の最終濃度が1.9mg/mL以上になるよう調製し、
投与時にこれ以上の濃度に希釈しないこと。薬剤投与前後にフラッシュを行うこと。
- 血管外漏出リスクは非炎症性に相当。
- 免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照。

参考文献

1) オプジーボ添付文書 2022年3月改訂版
2) N Engl J Med, 384, 2102-2114 (2021).