登録日	2023/3/28

登録番号	Uro016

腫瘍名	尿路上皮がん

申請医師	泌尿器科

投与スケジュール

GEM+CDDP 3weekly　　21日毎　×　PDまで

1コース　2コース

1 2 3 4 5 6 8 15 22 ・・・ (day)

	アプレピタント (Day2:125mg、Day3:80mg、Day4:80mg)		内服	1 2 3
①	フィジオ140	500 mL	点滴　60分	2
②	デキサート パロノセトロン 生理食塩水	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴　15分	2
③	デキサート 生理食塩水	6.6 mg 50 mL	点滴　15分	1 8 22
④	ゲムシタビン 生理食塩水	1000 mg/㎡ 100 mL	点滴　30分	1 8 22
⑤	生理食塩水 （フラッシュ用）	50 mL	点滴　5分 （全開投与）	1 8 22
⑥	20%マンニットール	300 mL	点滴　60分	2
⑦	シスプラチン 生理食塩水	70 mg/㎡ 500 mL	点滴　120分	2
⑧	フィジオ140	500 mL	点滴　2時間	2
⑨	フィジオ140 （Day3の10時までキープ）	1000 mL	点滴　16時間	2
⑩	フィジオ140 デキサート （1日4本の輸液を24時間でキープして投与）	2000 mL 6.6 mg	点滴　24時間	3 4 5
⑪	フィジオ140 （1日4本の輸液を24時間でキープして投与）	2000 mL	点滴　24時間	6

注意事項

・アプレピタント内服（Day2：125mg、Day3：80mg、Day4：80mg）（投与確定後に服用）
・Day2～5間は尿量1日3L以上を確保し、2～3L以下はマンニトール、ラシックスを併用する。
・Day2～3までのフィジオのキープ輸液の点滴時間は目安の投与時間となります。
（Day2のフィジオ2時間投与後に翌日までキープして投与します）

参考文献

1) 膀胱癌診療ガイドライン2019年版
2) Oncology, 69, 391-398 (2005).