


登録日 2014/4/4

登録番号 Anal001

腫瘍名 肛門がん

申請科 消化器内科

投与スケジュール



注意事項

- ・適応: 肛門管がん、扁平上皮がん。
- ・2コース実施。
- ・マイトマイシンCは20mg/コースの用量を上限とする。
- ・放射線は、1回1.8Gy 25回(総線量45Gy)で5週間かけて実施。
- ・骨髄抑制に対して下記の減量基準がある(文献からの参考基準)。
G4の好中球減少では、次回コースは50%に減量
マイトマイシン(DRUGDEXの情報)では下記減量基準もある
白血球数2000~2999/mm³ または血小板数25000~74999/mm³→70%量に減量
白血球数<2000/mm³ または血小板数<25000/mm³→50%量に減量
* 減量についてはその都度、患者のPSや病状に応じて主治医判断となる。
- ・放射線治療に伴い、下痢、腸管粘膜障害、照射部位の皮膚障害などのリスクがある。

参考文献

- 1) Jaffer A. Ajani *et al.*, Fluorouracil, Mitomycin, and Radiotherapy vs Fluorouracil, Cisplatin, and Radiotherapy for Carcinoma of the Anal Canal, *JAMA*, **299**, 1914-1921 (2008).
- 2) マイトマイシン注用 インタビューフォーム 2005年作成