

登録日 2018/11/27

レジメン名 BRE019

腫瘍名 乳がん

申請医師 乳腺外科

投与スケジュール

T-DM1				再発 21日毎 PDまで 術後 21日毎 14回まで	
				1コース	2コース
				1 8 15	22 ... (Day)
①	デキサート 生理食塩水	6.6 mg 50 mL	点滴 15分	↓	↓
②	生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL	点滴 5分		↓
③	カドサイラ 蒸留水 生理食塩水	3.6 mg/kg 20 mL 250 mL	点滴 30分	↓	↓
初回90分投与、2回目以降30分に短縮可能					
④	生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL	点滴 5分	↓	↓

注意事項

【適応】

- 手術不能または再発乳癌の二次治療以降
- 術後療法
術前薬物療法でpCRが認められなかった患者に投与する。術後で使用する場合、投与回数は14回までとする。

【使用上の注意】

- 病理結果にてHER2蛋白陽性者に限る。
- 初回投与の認容性が良好であれば、2回目以降の投与時間は30分間まで短縮できる。
- 投与の際には、心エコーによる心機能を確認する。
LVEF40%未満、あるいは40~45%でベースラインからのLVEF低下が10%以上の場合、投与延期。
モニタリングの頻度は、通常の患者では12週毎を目安に行う。
- 0.2または0.22 μ mインラインフィルターを使用する。
- ブドウ糖液との混合を避ける。
- 血管外漏出リスク: 炎症性

【減量・中止基準】

- 適正使用ガイドを参照。

【減量の目安】

- 1段階減量: 3.0mg/kg、2段階減量: 2.4mg/kg、3段階減量: 投与中止

参考文献

- 1) Verma S, et al, *N Engl J Med*, 367, 1783-1791 (2012).
- 2) Krop IE, et al, *Lancet Oncol*, 18, 743-754 (2017).
- 3) 乳がん診療ガイドライン2018年版
- 4) カドサイラ添付文書
- 5) カドサイラ適正使用ガイド