

登録日 2025/1/22

レジメン名 BRE038

腫瘍名 乳がん

申請医師 乳腺外科

投与スケジュール

Sacituzumab-Govitecan				21日毎 × PDまで			
				1コース	8	15	2コース
				1			22 ... (Day)
①	デキサート	9.9 mg	点滴 15分	↓	↓		↓
	パロノセトロン	0.75 mg		↓	↓		↓
	ポララミン	5 mg					
	ファモチジン	20 mg					
	生理食塩水	50 mL					
②	生理食塩水	50 mL	点滴 5分	↓	↓		↓
	(フラッシュ用)						
③	トロデルビ	10 mg/kg	点滴 180分	↓	↓		↓
	生理食塩水	250 mL		↓	↓		↓
				初回180分、副作用なければ2回目120分、3回目以降60分に短縮可			
				投与量が850mgを超える時、溶媒を500mLとする。			
				投与量が275mg未満の時、溶媒を100mLとする。			
④	生理食塩水	50 mL	点滴 5分	↓	↓		↓
	(フラッシュ用)						

注意事項

【適応】

- ①化学療法歴のあるホルモン受容体陰性かつHER2陰性の手術不能または再発乳癌
- ②化学療法歴のあるホルモン受容体陽性かつHER2陰性の手術不能または再発乳癌

【使用上の注意】

- ・アブレピタント内服を投与 (Day1:125mg, Day2～3:80mg)、Day2～3までデカドロン4mg/dayを投与
- ・投与終了後30分は、院内で観察を行う。

【減量・中止基準】

- ・適正使用ガイドを参照。

【減量の目安】

- ・1段階減量: 7.5mg/kg、2段階減量: 5mg/kg、3段階減量: 投与中止

1)N Engl J Med, 384, 1529-1541 (2021).

2)トロデルビ添付文書2026年3月