

登録日	2025/11/25
腫瘍名	乳がん


レジメン名	BRE042
申請医師	乳腺外科

投与スケジュール

DTX+フェスゴ

21日毎 × PDまで
(ドセタキセルは6～8コースまで)


初回投与(初回用量)



- | | | | |
|-------------------------|--------------------------------|--------------|------|
| ① フェスゴ配合皮下注IN
(初回用量) | 15 mL | 皮下注
(大腿部) | 8分以上 |
| ② デキサート
生理食塩水 | 6.6 mg
50 mL | 点滴 | 30分 |
| ③ ドセタキセル
5%ブドウ糖液 | 75 mg/m ²
250 mL | 点滴 | 60分 |
| ④ 生理食塩水
(フラッシュ用) | 50 mL | 点滴 | 5分 |



2回目以降(維持用量)



- | | | | |
|------------------------------|--------------------------------|--------------|------|
| ① フェスゴ配合皮下注MA
(2回目以降の維持量) | 10 mL | 皮下注
(大腿部) | 5分以上 |
| ② デキサート
生理食塩水 | 6.6 mg
50 mL | 点滴 | 15分 |
| ③ ドセタキセル
5%ブドウ糖液 | 75 mg/m ²
250 mL | 点滴 | 60分 |
| ④ 生理食塩水
(フラッシュ用) | 50 mL | 点滴 | 5分 |



注意事項

【適応】

- ・フェスゴはHER2陽性に使用する。
- ・手術不能または再発乳癌の治療
- ・手術可能な乳がん
術前及び術後の場合、術前はフェスゴおよびドセタキセルを4コース実施し、術後はフェスゴのみ14コース実施する。

【使用上の注意】

- ・フェスゴは、病理結果にてHER2蛋白陽性者に限る。

【使用上の注意】

- ・フェスゴは、大腿部に皮下投与すること(同一箇所へ繰り返し投与は避け、前回の注射部位から少なくとも2.5cm離すこと)
心機能を確認する(適正使用ガイド参照)。

当院の心エコー・心電図検査プロトコルを参考とする。

【投与延期してから再開する際の用量】

- ・フェスゴは、前回投与日から6週間以上の時は、改めて初回投与量を投与する。

参考文献

- 1) Lancet Oncol, 22, 85-97 (2021).
- 2) 添付文書(フェスゴ2023年11月改訂版、ドセタキセル2024年6月改訂版)