

登録日 2017/8/18

レジメン名 Col033

腫瘍名 大腸がん

申請診療科 消化器外科

投与スケジュール

IRIS+Bmab				28日毎 × PD							
				1コース		2コース					
				1	8	15	22	29	...	(day)	
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴 5分 全開	↓		↓		↓			
②	ベバシズマブBS 生理食塩水	5 mg/kg 100 mL	点滴 30分	↓		↓		↓			
				初回90分、副作用なければ2回目60分、3回目以降30分に短縮可							
③	生理食塩水 (アバステン用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 全開	↓		↓		↓			
④	デキサート パロノセトロン 生理食塩水	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴 15分	↓		↓		↓			
⑤	イリノテカン 5%ブドウ糖	100 mg/m ² 500 mL	点滴 90分	↓		↓		↓			
⑥	生理食塩水 (イリノテカン用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 全開	↓		↓		↓			
⑦	テガフルール・ギメラシル・オテラシル	80 mg/m ²	経口	Day1~14				Day29~			

注意事項

【適応】切除不能・再発大腸がん(現時点では、ガイドライン2016年版に準じて2次治療以降に使用)

(*参考文献¹⁾に従い毒性・安全性を考慮して、イリノテカン用量は100mg/m²である)

【減量基準の参考値】(臨床試験から引用)

Grade4の血液毒性又はGrade3以上の非血液毒性発現時:次コースの用量を1レベル減量

テガフルール・ギメラシル・オテラシル:20mg/日ずつ減量(120mg/日⇒100mg/日⇒80mg/日)

イリノテカン:20mg/m²減量(100mg/m²⇒80mg/m²)

参考文献

1) Y. Komatsu, et al, Phase II study of combined chemotherapy with irinotecan and S-1 (IRIS) plus bevacizumab in patients with inoperable recurrent or advanced colorectal cancer, Acta Oncologica, 51, 867-872, 2012.

2) アバステン添付文書

3) イリノテカン添付文書

4) エスワンタイホウ添付文書

5) 大腸癌治療ガイドライン2016年版