

登録日 2018/6/26

登録番号 Col036

腫瘍名 大腸がん

申請診療科 消化器外科

### 投与スケジュール

mXELIRI+Bmab				21日毎 × PDまで	
				1コース	2コース
				1 8 15	22 ... (day)
①	生理食塩水 (プライミング用)	50 mL	点滴 5分	↓	↓
②	ペバシズマブBS 生理食塩水	7.5 mg/kg 100 mL	点滴 30分	↓	↓
				初回90分、副作用なければ2回目60分、3回目以降30分に短縮可	
③	生理食塩水 (アバステン用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓	↓
④	デキサート パロノセトロン 生理食塩水	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴 15分	↓	↓
⑤	イリノテカン 5%ブドウ糖	200 mg/m <sup>2</sup> 500 mL	点滴 90分	↓	↓
⑥	生理食塩水 (イリノテカン用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分 (全開)	↓	↓
⑦	ゼローダ	1600 mg/m <sup>2</sup>	経口 朝、夕	Day 1~14	Day22 ~

### 注意事項

**【使用上の注意】**

- ・2次治療以降
- ・UGT1A1遺伝子多型の測定を実施する。
- ・\*6, \*28ダブルヘテロ接合体、\*6ホモ接合体、\*28ホモ接合体では、イリノテカン開始量150mg/m<sup>2</sup>とする。

**【減量基準】**参考値

- ・減量レベル1: イリノテカン150mg/m<sup>2</sup>(上記遺伝子多型で初回減量した場合: 125mg/m<sup>2</sup>)、アバステン減量なし
- ・減量レベル2: イリノテカン125mg/m<sup>2</sup>(上記遺伝子多型で初回減量した場合: 100mg/m<sup>2</sup>)、アバステン減量なし
- ・適正使用の基準を参照(DINETからイリノテカンを検索)

### 参考文献

1) Lancet oncol. March 16, 2018, online