

登録日 2013/4/23

レジメン名 Eso006

腫瘍名 食道がん

申請医師 消化器内科

投与スケジュール

PTX			49日毎								
			1コース						2コース	(day)	
			1	8	15	22	29	36	43	50	...
①	デキサート ポラミン ファモチジン 生理食塩水	6.6 mg 5 mg 20 mg 50 mL	点滴 15分	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
②	パクリタキセル 5%ブドウ糖液	100 mg/m ² 250 mL	点滴 60分	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
③	生理食塩水 (フラッシュ用)	50 mL	点滴 5分 全開	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓

注意事項

0.22 μmのメンブランフィルターを使用すること。
白金製剤を含む化学療法の前治療歴のある進行または再発食道がん患者を対象とする。
腎機能低下に伴いCDDP使用困難症例では、1st lineとしての選択も考慮することができる。

反復投与基準 好中球数 ≥ 1000/μL

- Grade2の末梢神経障害、関節痛、筋肉痛の場合には減量して継続する
- Grade3以上の末梢神経障害の場合には、Grade2以下になるまで投与を延期する
- Grade3以上の非血液毒性が発現していない
- その他臨床管理不能な有害事象がない

減量基準 下記の有害事象が発現した場合、次コースは20mg/m²減量し、60mg/m²まで減量する。
(100mg/m² → 80mg/m² → 60mg/m²)

- 好中球数 ≤ 500/μL
- 血小板数 2.5万以下
- Grade2の末梢神経障害、関節痛、筋肉痛
- 前回投与後にGrade3以上の非血液毒性が発現した場合

参考文献

Kato K, Tahara M, Hironaka S, Muro K, Takiuchi H, Hamamoto Y, Imamoto H, Amamo N, Serio I
A phase II study of paclitaxel by weekly 1-h infusion for advanced or recurrent esophageal cancer
in patients who had previously received platinum-based chemotherapy.
Cancer Chemother Pharmacol 67:1265-1272(2011) 添付文書