

登録日 2022/4/26

登録番号 Eso013

腫瘍名 食道がん

申請科 消化器外科

投与スケジュール

FP+Pembrolizumab			21日毎 PDまで (シスプラチンは最大6コースまで)		
			1コース	2コース	
			1 2 3 4 5 6 7	22 ...	
			(day)		
①	ホスアプレピタント 生理食塩水	150 mg 500 mL	点滴 60分	↓	↓
②	デキサート パロノセトロン 生理食塩水	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴 15分	↓	↓
③	生理食塩水 (前投薬用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分	↓	↓
④	キイトルーダ 生理食塩水	200 mg 100 mL	点滴 30分	↓	↓
⑤	生理食塩水 (キイトルーダ用フラッシュ)	50 mL	点滴 5分	↓	↓
⑥	20%マンニトール	300 mL	点滴 60分	↓	↓
⑦	シスプラチン 生理食塩水	80 mg/m ² 500 mL	点滴 120分	↓	↓
⑧	フルオロウラシル 生理食塩水	800 mg/m ² 500 mL	点滴 24時間	↓ ↓ ↓ ↓ ↓	↓
⑨	フィジオ140	500 mL	点滴 3時間	↓	↓
⑩	フィジオ140 <small>(Day2の10時までキープして投与)</small>	1000 mL	点滴 16時間	↓	↓
⑪	フィジオ140 デキサート プリンペラン	2000 mL 6.6 mg 20 mg	点滴 24時間	↓ ↓ ↓	
⑫	フィジオ140 プリンペラン	2000 mL 20 mg	点滴 24時間		↓ ↓
			<small>(1日4本の輸液を24時間でキープして投与)</small>		

注意事項

- ・適応
化学療法歴のない根治切除不能な進行・再発食道がん(扁平上皮癌、食道腺癌、食道胃接合部の腺癌含む)
- ・7コース目からキイトルーダ、フルオロウラシルのみ継続(③、④、⑤、⑧のみ継続する)
- ・Day1～2までのフィジオのキープ輸液の点滴時間は目安の投与時間となります。
(Day1のフィジオ3時間投与後に翌日までキープして投与します。)
- ・尿量はシスプラチン投与後24時間ごとに確認。尿量2000mL未満でDr Call。
- ・体重測定を毎日実施。2kg増加でDr Call
- ・キイトルーダは、インラインフィルターを使用(0.2～5μm)。
同一の点滴ラインで他の薬剤を併用同時投与しないこと。
- ・免疫チェックポイント阻害薬の運用フローを参照

参考文献

- 1) Lancet, 398, 759-771 (2021).
- 2) 添付文書(キイトルーダ2022年2月改訂版、シスプラチン2022年3月改訂版、フルオロウラシル2018年11月改訂版)