

登録日 2011/4/7

登録番号 Gas016

腫瘍名 胃がん

申請診療科 消化器内科

投与スケジュール

XP			21日毎 ×PDまで		
			1コース	2コース	
			1 2 3 4 5	22 ... (day)	
①	プロイメンド 生理食塩水	150 mg 500 mL	点滴 1時間	↓	↓
②	デキサート パロノセトロン 生理食塩水	9.9 mg 0.75 mg 50 mL	点滴 15分	↓	↓
③	20%マンニトール	300 mL	点滴 60分	↓	↓
④	シスプラチン 生理食塩水	80 mg/m ² 500 mL	点滴 120分	↓	↓
⑤	フィジオ140	500 mL	点滴 3時間	↓	↓
⑥	フィジオ140 (Day2の10時までキープして投与)	1000 mL	点滴 16時間	↓	↓
⑦	フィジオ140 デキサート プリンペラン	2000 mL 6.6 mg 20 mg	点滴 24時間	↓ ↓ ↓	
			(1日4本の輸液を24時間でキープして投与)		
⑧	フィジオ140 プリンペラン	2000 mL 20 mg	点滴 24時間		↓
			(1日4本の輸液を24時間でキープして投与)		
⑨	ゼローダ	2000 mg/m ²	経口	Day 1~14	Day 22~
			(注意事項参照)		

注意事項

- ・⑤のデキサートはDay4まで投与。
- ・ゼローダ使用中に伴い、HFS予防に保湿剤(ウレパールやヒルドイド)が必要です。
- ・ゼローダ投与方法は添付文書のC法に該当する(1日用量)。
 1.36m²未満:2400mg、 1.36~1.66m²:3000mg
 1.66~1.96m²:3600mg、 1.96m²以上:4200mg
- ・Day1~2までのフィジオのキープ輸液の点滴時間は目安の投与時間となります。
(Day1のフィジオ3時間投与後に翌日までキープして投与します。)
- ・尿量はシスプラチン投与後24時間ごとに確認。尿量2000mL未満で
- ・体重測定を毎日実施。2kg増加で

参考文献

Capecitabine/cisplatin versus 5-fluorouracil/cisplatin as first-line therapy in patients with advanced gastric cancer: a randomised phase III noninferiority trial. Annals of Oncology
 doi:10.1093/annonc/mdn717